

Falcon 460 EC

Fungitsiid Taimekaitsevahend



N - Keskkonnaohtlik C – Söövitav

Kasutusala: Fungitsiid nisu, odra, rukki ja kaera seenhaiguste tõrjeks.
Falcon 460 EC võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Eesti reg. nr.: 0198/14.12.00

Kehtiv kuni: 31.12.2008

Toimeained: spiroksamiin 250 g/l,
tebukonasool 167 g/l,
triadimenool 43 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

Neto kaal: 5 l

Partii number ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt

Valmistaja ja pakkija:

Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Str. 50
D-40789 Monheim
Deutschland

Eestisse toimetajad ja turustajad:

Berner Eesti OÜ,
Tulika 19, 10613 Tallinn
tel.: (0) 650 50 40;
faks: (0) 650 50 60

AS Kemira GrowHow
Peterburi tee 44
11415 Tallinn
tel.: 606 2260
faks: 606 2278

Kesko Agro Eesti AS
Põrguvälja tee 3a
Pildiküla, Rae vald
75301 Harjumaa
tel.: 6059 140
faks: 6059 101

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, järgi kasutusjuhendi nõudeid! Väga mürgine veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet! Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. Põhjustab söövitust. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust ja –kindaid ning silmade- või näokaitset. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimalusel näidata talle pakendit või etiketti). Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit . Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal

toiduainest, joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Hädaabi telefon: 112.

Esmabi: Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimalusel näidata pakendit või etiketti). Kannatanu viia ohutsoonist eemale. Teadvusekaotuse ohu puhul asetada/transportida stabiilses, külili asendis. Jälgida ka isiklike ohutusabinõusid. Eemaldada kohe preparaadiga kokkupuutunud või läbiimbunud riided ning kahjutustada need ohutult.

Sissehingamisel: Tuua kannatanu otsekohe värske õhu kätte ning seejärel pöörduda koheselt arsti poole.

Kokkupuutel nahaga: Pesta koheselt rohke vee ja seebiga. Pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: Loputada otsekohe rohke veega ja pöörduda silmaarsti poole.

Allaneelamisel: Mitte esile kutsuda oksendamist. Loputada suud. Kutsuda koheselt kiirabi.

Ravi abinõud: sümptomaatiline ravi. Kõhulahtistid, aktiveeritud süsi ja naatriumsulfaat.

Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas, hästiventileeritavas lukustatud kohas temperatuuril mitte alla -20 °C ega üle +40 °C. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virmadesse kui 2 m, et vältida toote kahjustamist. Garanteeritud säilivusaeg õigel temperatuuril ladustatuna on 2 aastat valmistamisest.

Taara purunemisel: Katta väljavoolanud preparaat liiva, saepuru või absorbendiga kuni segu on täielikult läbiimbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Pakendite kahjutustamine: Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara-ja aparatuuri pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Traktoripritsi täitmisel lahtisest veekogust ei tohi kasutada pritsi oma täitmiseseadmeid.

Ohutusnõuded: Säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb täita hügieeni ja ohutustehnika üldnõudeid. Isikukaitsevahendid tuleb kasutamise järel hoolikalt puhastada.

Kasutamise juhend: Falcon 460 EC on laia toimespektriga fungitsiid, mis sisaldab kolme toimeainet. Preparaat mõjub nii profülaktiliselt kui ka ravivalts nakkuse algstaadiumis ning annab taimedele pikaajalise (mitmenädalase) kaitse. Pritsida võib nii iseseisvalt kui ka segus teiste preparaadidega, esmaste haigustunnuste ilmumisel järgmiste teraviljahaiguste vastu:

- kõrreliste jahukaste (*Erysiphe graminis*)
- teraviljaroosted (*Puccinia sp.*)
- helelaiksus e.septorioos (*Septoria sp.*)
- äärislaiksus (*Rhynchosporium secalis*)
- võrklaiksus (*Pyrenophora teres*)
- pruunlaiksus (*Helminthosporium sativum*)

Preparaati võib edukalt kasutada kõigis taime kasvu faasides. Esimese pritsimise võib teha kevadel, nt jahukaste vastu ning teise pritsimise hiljem mõne teise preparaadiga, nt Folicur või Sphere. Falcon on efektiivne ka pähikule lööbivate fusariooside vastu. Sel juhul tuleb pritsida teravilja õitsemise ajal kulunormiga 0,8 l/ha.

Kulunorm on kõikidel teraviljadel 0,6-0,8 l/ha..

Kui hooajal tehakse fungitsiididega ühel põllu rohkem kui üks pritsimine, on Falconi kulunorm esimesel pritsimisel 0,3-0,4 l/ha.

Kasutatakse 1 kord hooaja jooksul.

Optimaalne vee hulk: 200-400 l/ha

Vihmakindlus: 1 tund

Ooteaeg: 20 päeva.

Pritsimislahuse valmistamine: Enne pritsimislahuse valmistamist veendu, et prits, pihustid jm agregaadid osad oleksid puhtad. Täida pritsi paak esmalt poole vajamineva vee kogusega, käivita segisti. Enne Falcon 460 EC kanistri avamist loksuta preparaati hoolikalt. Lisa preparaat, sega hoolikalt ja seejärel lisa ülejäänud vee kogus. Valmistatud pritsimislahust kasuta kohe ilma vaheaegasid tegemata ja seejuures peab kindlasti töötama pritsi lahusesegisti. Pritsimislahust valmistada ainult vajaminev kogus. Kasutatud taara loputada 3 korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse pritsimislahusesse.

Segatavus teiste preparaatidega: Falcon 460 EC-d võib kasutada pritseprogrammides teiste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaatorite ja vedelväetistega (helaadi vormis). Järgige segamise soovitusi preparaatide etikettidel. Kui segupartneri etikett ei ütle teisiti, soovitage valada Falcon 460 EC pritsimislahusesse esimesena. Kultuurile ohutuim on, kui paagisegus ei ole korraga rohkem kui kaks preparaati. Kui pritsimislahusesse valatakse üle kahe erineva preparaadi, suureneb fütotoksilisuse oht taimedele (lehtede põletused). Küsimuste tekkimisel pöörduda tootja või maaletooja esindaja poole.

Pritsimistehnoloogia: Enne tööleasumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Kui pritsiga on enne pritsitud teisi aineid, tuleb ta enne kasutamist hoolikalt läbi pesta. Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Pritsi puhastamine: Pärast töö lõpetamist pesta prits, voolikud ning pihustid hoolikalt vee ning spetsiaalse pesuvahendiga.

Tähelepanu !

Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

®=registreeritud kaubamark kuulub firmale BayerCropScience AG