

Mustang*



Preparaadi vorm: suspoemulsioon

Toimeaine: florasulaam 6,25 g/l; 452,5 g/l 2,4-D etüülheksüülester

Registreerimisnumber: 0217/21.02.02

Pakend: 1 l ja 5 l

Mustang* on kaheiduleheliste umbrohtude tõrjepreparaat suvi- ja taliteraviljadel.

Mustangi võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Kasutusjuhend

Toimeviis: Mustang on süsteemne herbitsiid, mis koosneb kahest toimeainest: florasulaam ja 2,4-D etüülheksüülester, mis omastatakse taime lehtede kaudu. Florasulaam peatab taime aminohapete sünteesi ja 2,4-D etüülheksüülester toimib kasvuhormoonide pidurdajana, mille tagajärjel ei saa taimerakud enam jaguneda.

Tõrjespekter

VÄGA HEA TÕRJEFEKT	KESKMINE TÕRJEFEKT	RAHULDAV TÕRJEFEKT
rukkilill, malts, piimohakas, harilik hiirekõrv, põldohakas, virn e. roomav madar, vesihein, magun, harilik kirburohi, konnatatar, valge karikakar, põld-litterhein, kesalill, põld-lõosilm, põldrõigas, põldsinep, raps võorkultuurina	põldkannike, verev iminõges, võilill, põldosi, kare, kõrvik, piimalill	harilik punand

Kasutamise aeg: Mustangi kasutatakse tärganud umbrohtude tõrjeks kevadel alates vegetatsiooniperioodi algusest, kui temperatuur on +5 °C. Teravilju võib pritsida 2 lehe faasist kuni teise kõrresõlme moodustumiseni. Pritsitavad umbrohud ei tohiks olla suuremad kui 2–4 lehte.

KULUNORMID	l/ha
Suviseteraviljad	0,4–0,6
Taliteraviljad	0,4–0,6

Vee hulk: 100–300 l/ha, olenevalt pritsimistehnikast.

Paagisegud: Mustangi võib segada fungitsiididega Falcon, Juventus®, Tilt®, Artea®, Mentor®, Allegro® Plus, Folicur®, Corbel®, Tango® Super; insektsiidiga Fastac®, Decis Extra, Calypso; kasvuregulatoriga CCC™ ja leheväetistega X-leheväetis™ ja Super leheväetis™.

Kasutuspiirangud: mitte kasutada liblikõieliste allakülvi korral. Vältida segamist Ceronega.

Asendus- ja järelkultuurid: kui Mustangiga pritsitud kultuur on mingil põhjusel hävinud, võib asenduskultuurina samale põllule külvata teravilju ja maisi. Järgneval aastal võib samal põllul kasvatada kõiki kultuure.