

Sencor WG 70

Taimekaitsevahend
Herbitsiid



Xn Kahjulik



N Keskkonnaohtlik

Kasutusala: Herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks kartulil.

Eesti reg. nr.: 0026/19.11.04

Kehtiv kuni: 31.12.2008

Toimeaine: metribusiin 700 g/kg

Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid

Kemikaal sisaldab ohtlikku ainet metribusiini.

Sencor WG 70 võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Valmistamise kuupäev ja partii number: vaata pakendilt

Pakend: 1 kg

Valmistaja ja pakkija:

Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel str 50,
40789 Monheim
Saksamaa

Eestisse toimetaja ja turustajad:

Berner Eesti OÜ,
Tulika 19, 10613 Tallinn
tel.: 650 50 40;
faks: 650 50 60

AS Kemira GrowHow
Peterburi tee 44
11415 Tallinn
Tel: 606 2260
Faks: 606 2278

Kesko Agro Eesti AS
Põrguvälja tee 3a
Pildiküla, Rae vald
75301 Harjumaa

AS Schetelig EV
Ehitajate tee 148 A
Tallinn
Tel 651 29 50

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, järgi kasutusjuhendi nõudeid.

Kahjulik allaneelamisel.

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

Ettevaatusabinõud: Preparaadiga töötamisel kasutada eririietust (kummisaapad, kummikindad, peakate, spetsiaalne tööülikond, respiraator). Pärast töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad, samuti kaitseriietus (ka kinnaste sisepeind).

Esmaabi:

Üldinformatsioon:

Viia kannatanu ohutsoonist eemale. Teadvusekaotuse ohu puhul, asetada/ transportida stabiilses, külili asendis. Eemaldada otsekohe preparaadiga kokkupuutunud või läbiimibunud riided.

Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida puhkeasendis. Pöörduda koheselt arsti poole.

Kokkupuutel nahaga: Pesta koheselt rohke vee ja seebiga. Kasutada ravimeid vastavalt näidustustele.

Silma sattumisel: Loputada silmi põhjalikult veega. Võtta koheselt ühendust silmaarstiga.

Allaneelamisel: Mitte esile kutsuda oksendamist. Loputada suud rohke veega. Pöörduda koheselt arsti poole.

Informatsioon arstile: Ravi sümptomaatiline. Kõhulahtistid, seejärel aktiivsüsi ja naatriumsulfaat.

Hädaabi telefon: 112

Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida eemal soojus- ja süttimisallikast, temperatuuril mitte üle +40 °C. Eelpoolnimetatud tingimustes hoiustatuna tagab firma kinnises pakendis oleva preparaadi säilivuse vähemalt 3 aastat.

Taara kahjutustamine: Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Taara purunemisel: Välja voolanud preparaati mitte kasutada, vaid koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja aparatuuri pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Traktoripritsi täitmisel lahtisest veekogust ei tohi kasutada pritsi oma täitmisseadmeid. Pritsimisel jälgida, et preparaat ei kanduks tuulega vette.

Ohutusnõuded: Säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb täita hügieeni ja ohutustehnika üldnõudeid. Isikukaitsevahendid tuleb kasutamise järel hoolikalt puhastada.

Kasutusjuhend: umbrohtude vastu pritsitakse enne kartuli tärkamist või tärkamisjärgselt, kui kartulitaimed on keskmiselt 5 – 8 cm kõrgused ning kui umbrohud on idulehe faasis.

Sencor 70 WG-d võib pritsida kas üks või kaks korda, vastavalt mulla niiskusele ja umbrohtude tärkamise ühtlikkusele. Jagatud kasutamine on otstarbekas, kui põllul esineb rohkesti põld-piimohakat ja soo-nõianõgest, samuti märgadel ja huumusrikastel põldudel. Teist korda pritsides peaksid kartulitaimed olema umbed 10 cm kõrgused. Sencor 70 WG-d võib kasutada koos teiste kartulile sobivate herbitsiididega toimespektri laiendamiseks.

Kulunormid: kg/ha

Mulla tüüp	enne kartuli tärkamist		pärast kartuli tärkamist
liivmullad, kerged mullad	0,5	või	0,3

